

必看！2020 年外科主治医师考试指导教材变动情况

2020 年外科主治医师考试指导教材已经公布，经过来学网专业人员核对，与 2019 年教材相比有所变化，为了帮助大家了解，来学网为大家整理变动内容如下：

页 码 (2020)	2019 年指南	2020 年指南
2	GI	H
3		增加未控制大量尿排出等
5	20ml	10~20ml
12	400ml	300~400ml
20	全身无痛	全身痛觉丧失
35	一个	单个
36	周围组织	淋巴结
37		增加和中节交界处
38	6~12 日	7~8 天
44		增加稳定伤情
55	2005	2015
72		删除位于…恶性
72	头臂静脉	无名静脉
75		删除结节…恶性 删除颈部…恶性
106	直径 0.6~0.8cm	外径 0.5~1.0cm
106	梗阻	阑尾管腔梗阻
134	又叫直肠切除术。适用于直肠癌下缘距肛门 10cm 以上的，手术时尚能留下足够的直肠，可在腹腔内与乙状结肠行对端吻合者。	一般要求肿瘤距离齿状线 5cm 以上，远端切缘距离肿瘤下缘 2cm 以上，以能根治切除肿瘤为原则。
209*		表格位置改变
229	我国于 1983 年初拟定的骨肿瘤分类见表 3-1501. 主要特点为： 1. 把骨肿瘤分为良性、中间性和恶性 3 类。 2. 将骨巨细胞归纳于组织来源。 3. 分类按照临床、病理和 X 线相结合的原则。表 3-15-1 骨肿瘤分类表	2013 年 WHO 发布了新版骨肿瘤分类，把骨肿瘤分为良性、中间性和恶性三类(表 3-15-1) 表 3-15-1WHO 骨肿瘤的分类(2013) 表格内容变动较大。 普外科不要求
233	软骨肉瘤中“好发部位长骨，其次为髌骨”	此句话删除。普外科不要求
301	脑血管疾病中，脑动静脉畸形中“1. 概论发病年龄 16~35 岁最多(平均 25.7 岁)，发病率和脑动脉瘤相似(我国)”	此内容删除。普外科不要求
309	正常人排尿白天 4~5 次	正常人排尿白天 3~6 次
310	多尿是指在 24 小时内尿量达到	多尿是指在 24 小时内尿量>2500ml

	数千毫升以上	
330	急性附睾炎的诊断中 第1点：根据病史及检查，急性 附睾炎诊断不困难	增加“但需与睾丸扭转、附睾及睾丸肿瘤等 鉴别”普外科不要求。
330	急性附睾炎的诊断中 第2点：血白细胞增多	此点删除。普外科不要求
341	6岁以内	1-5岁之间
345		减好发年龄为15-35岁男性，加一句话
356	一般为2cm	肿瘤平均直径为1.8cm，很少超过3cm
371	经口摄食不能	不能经口摄食
468	鞘膜积液可分为两种类型	鞘膜积液可分为五类